

# Vårens tidigaste dagfjärilar



**Citronfjäril** *Gonepteryx rhamni*  
Ofta den första fjäril man ser på våren. Hanen är citrongul och honan blekgul. Fjärilen visar inte vingovansidan i vila. Arten är vanlig och finns i hela landet. Den har inga förväxlingsarter under tidig vår.



**Påfågellöga** *Aglais io*  
En omisskännlig art med tydliga ögonfläckar på vingarna för att avskräcka rovdjur. Vingundersidorna är svarta. På våren håller hanen revir på en solig, vindstilla plats. Arten är vanlig och förekommer i hela landet.



**Sorgmantel** *Nymphalis antiopa*  
En stor fjäril som inte kan förväxlas med andra arter. Arten påträffas främst i skogsmark. Den är ganska skygg, men dras till savande björkar och kan där observeras närmare. Förekommer i hela landet utom i fjällkedjan.



**Amiral** *Vanessa atalanta*  
Känns lätt igen på de mörka vingarna med röda band. Förekom tidigare enbart som migrant i Sverige. Det varmare klimatet har dock gjort att den ibland lyckas övervintra i södra Sverige. Kan då ses födosöka på sälgtillsammans med övriga tidiga arter.

Guiden är skapad av Eriks Fjärilspodd, Rikare trädgård och Natursidan.se. Foton: Citronfjäril: Rolf Dietrich Brecher/CC-BY-2.0, Sorgmantel: AfroBrazilian/CC-BY-SA-4.0, Amiral: gailhamphshire/CC-BY-SA-2.0, Näselfjäril: Estormiz/CC-Zero, Övriga arter: Janne Svantesson



**Vinbärsfuks** *Polygonia c-album*  
En liten fuks med mycket flikiga vingar. Hanen försvarar revir, främst i soliga gläntor i skogsmark. På bakvingens undersida kan man se ett vitt C, vilket gett arten dess latinska namn. Utbredd i hela landet, förutom i fjällkedjan.



**Näselfjäril** *Aglais urticae*  
En av våra vanligaste dagfjärilar som finns i hela landet. Arten gynnas av människan dels genom kväveutsläpp som ger fler nässlor, dels genom övervintring i byggnader. Den är mindre än körsbärs- och videfuks, har klarare färger och mer svart på bakvingen.



**Körsbärsfuks** *Nymphalis polychloros*



Stor art. Mycket lik videfuks. Skiljs genom: ljusgul fläck vid framvingens spets, bakvingens svarta bård har skarp gräns med gult innanför, mörka ben. Bofast i sydöstra Sverige, men kan dyka upp i andra delar. Hanen försvarar revir på soliga, vindstilla platser.



**Videfuks** *Nymphalis xanthomelas*



Mycket lik körsbärsfuks. Skiljs genom: vit fläck vid framvingens spets, diffus avgränsning av bakvingens svarta bård, ljusa ben. Försvarar revir likt körsbärsfuks och har liknande utbredning, men är mer sällsynt.